

플라스마라이트 148주 Plasma-lyte 148 Solution for Infusion

분류번호	전문의약품
331	

■ 원료약품 및 그 분량

100 ml 중,	
염화나트륨(EP)	526 mg
염화칼륨(EP)	37 mg
염화마그네슘수화물(EP)	30 mg
아세트산나트륨수화물(EP)	368 mg
글루콘산나트륨(USP)	502 mg
pH조정제: 수산화나트륨(EP)	적량
용제: 주사용수(EP)	적량

■ 성상

무색투명한 액이 플라스틱 용기에 충전된 수액용 주사제

■ 효능·효과

순환혈액량 및 조직간액의 감소시 세포외액의 보급, 보정
대사성 산증의 보정

■ 용법·용량

보통 성인 1회 500 - 1,000 mL를 점적 정맥주사한다. 투여속도는 시간당 200 mL로 한다. 투여량, 투여속도는 연령, 체중, 증상에 따라 적절히 증감한다

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 수분과다상태 환자
- 2) 고나트륨혈증 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 울혈성심부전, 신부전 및 나트륨 저류로 인한 부종 환자
- 2) 고칼륨혈증, 칼륨 저류 환자
- 3) 대사성 또는 호흡성 알칼리증 환자
- 4) 초산염이나 글루콘산염이 증가되어 있거나 간부전과 같이 이러한 이온의 이용이 손상된 환자
- 5) 고장성 탈수증 환자
- 6) 저나트륨혈증(120 mmol/L 미만) 환자

3. 이상반응

- 1) 주사부위의 열감, 감염, 정맥혈전증, 정맥염, 삼출, 과다혈량이 나타날 수 있다.
- 2) 대량·급속투여에 의해 뇌부종, 폐부종, 말초부종, 대사성 알칼리증이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약은 나트륨을 함유하므로 코르티코스테로이드 또는 코르티코트로핀 투여를 받는 환자는 주의하여 투여한다.
- 2) 혈당, 혈청 전해질, 체액 평형을 정기적으로 모니터링해야 한다.

5. 임부, 수유부, 가임여성, 신생아, 유아, 소아, 고령자에 대한 투여

임신중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

■ 저장방법

밀봉용기, 실온보관

■ 포장단위

500 ml, 1000 ml

■ 제조원

전공정위탁제조(제조의뢰자)

Baxter, S.L.

c/ Pouet de Camilo, 2-Pol. Ind.
Sector 14 46394 Ribarroja Del Turia
(Valencia)(스페인)

전공정위탁제조(제조사)

Bieffe Medital, S.A.

Ctra. De Biescas, s/n, 22666
Sabiñánigo (Huesca) (스페인)
(원산지:스페인)

수입자

(주)박스터, 서울시 종로구 종로 1
교보생명빌딩 10층 1001호
(Tel: 02-6262-7100)

* 만일 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환해드립니다.

* 이 첨부문서 작성일자 (2015년 4월 15 일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하실 수 있습니다.

SA-30-02-003

1

